OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr. 50)

72,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUSEUM OF COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

QUINZIÈME FASCICULE

(10 juillet 1915)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1915

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS

INTRODUCTION

Comme précédemment je rédigerai mes diagnoses latines de façon uniforme, en les masculinisant toutes ; j'en ai expliqué les raisons précédemment et n'y reviendrai pas.

Les nouveautés décrites dans le présent fascicule font partie de ma collection, à l'exception de deux formes de *Tetraonyx* Latr., du Guatemala, figurant en note et de deux *Phrisothrix* E. Ol. de l'Amérique Méridionale, également signalés en note.

Dans le présent fascicule j'ai décrit 3 genres nouveaux et environ 60 espèces rentrant dans diverses familles et comprenant des Dermestides, Anobiides, Hétéromères, Scaphidiides et Drilides.

NOUVELLES ESPÈCES DE DIVERSES FAMILLES

Dermestes maximus n. sp. Latus, parum convexus, subnitidus, rufus, luteo sat sparse pubescens, oculis nigris, elytris costulatis.

Large, peu convexe, un peu brillant, roux avec les yeux noirs, orné d'une pubescence jaunâtre assez espacée. Tête densément ponctuée ; antennes rousses, à massue plus claire ; prothorax court, subarqué en avant, sinué postérieurement, à ponctuation assez forte et un peu écartée sur le disque, impressionné de chaque côté antérieurement et sur la base ; élytres de la largeur du prothorax, munis de faibles côtes discales, à angle sutural émoussé, à ponctuation en partie granuleuse, plus forte sur la base ; dessous du corps uniformément pubescent ; pattes rousses, robustes. Long. 12 mill. Congo.

Cette espèce, remarquable par sa forme large jointe à sa coloration, peut prendre place près de *D. bicolor* F.

Telopes senegalensis n. sp. Oblongus, subnitidus, luteo pubescens, niger, thorace lateraliter brunnescente, elytris rufis, antennis pedibusque testaceis.

Oblong, peu brillant, orné d'une pubescence jaunâtre couchée et peu serrée, noir avec les côtés du prothorax roussâtres, les élytres roux, les pattes et antennes testacées. Tête densément ponctuée ainsi que le prothorax, celui-ci court, retréci en avant ; élytres de la largeur du prothorax, courts, courtement atténués à l'extrémité, à ponctuation ruguleuse diversement écartée, ces organes offrant une vague bande antérieure subarquée faite de poils jaunes ; pattes robustes. Long. 3,5 mill. Sénégal : Dakar.

Diffère de *T. breviusculus* Reitt. par la forme moins courte, la coloration plus claire, etc.

Æthriostoma atricolor n. sp. Ovatus, parum

nitidus, niger, sparse griseo aut luteo pubescens, elytris ad medium parum distincte griseo fasciatis.

Ovalaire, peu brillant, noir, orné d'une pubescence grise ou jaunâtre écartée, avec la trace, sur le milieu des élytres, d'une fascie grise, corps noir pattes comprises. Tête large ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation moyenne, plus écartée sur le disque ; élytres de la largeur du prothorax, courts, atténués à l'extrémité, à ponctuation forte et rapprochée, ligne suturale marquée postérieurement ; pygidium assez saillant. Long. 3 mill. Sumatra : W. Preauger.

Voisin de *Æ. sparsuta* Reitt. mais pattes foncées et élytres sans mouchetures.

Æthriostoma purpurea n. sp. Oblongus, nitidus, sparse punctatus, purpureo sat sparse pubescens, rubro-purpureus, oculis nigris.

Oblong, brillant, éparsément ponctué, orné d'une pubescence pourprée peu serrée et couchée, d'un pourpré rougeâtre avec les yeux noirs. Tête large ; prothorax court, rétréci en avant, subarqué sur les côtés, rebordé sur la base ; élytres de la largeur du prothorax, assez longs, progressivement atténués en arrière, rebordés sur la base, à ligne suturale postérieure nette ; pattes assez longues. Long. près de 5 mill. Madagascar : Mahatsinjo.

Espèce des plus distinctes par son système de coloration.

Pseudomegatoma nov. gen. Antennis 11 articulatis, apice subincrassatis, pedibus elongatis, thorace lateraliter valde carinato.

Ce nouveau genre, voisin de *Megatoma* Sam., est très distinct par la structure des antennes qui n'ont pas de massue distincte mais sont progressivement épaissies presque dès la base ; les pattes sont longues et grêles, le prothorax fortement caréné sur les côtés et distinctement rétréci en avant, le prosternum est élargi en avant, en forme de mentonnière et les pattes intermédiaires sont assez rapprochées.

Pseudomegatoma boliviensis n. sp. Angustatus, elongatus, nitidus, sat sparse albo pilosus, niger, pedibus pro parte rufescentibus, elytris rufo trimaculatis, maculis albo pubescentibus.

Allongé et étroit, brillant, orné d'une pubescence blanche assez écartée, noir avec les pattes en partie roussâtres, élytres ornés chacun de 3 macules testacées revêtues de poils blancs, la première grande remontant vers les épaules, la 2e sinuée, en dessous du milieu, la 3e subarrondie, vers le sommet. Tête un peu plus étroite que le prothorax, yeux grands ; antennes robustes, à 3e article petit, dernier article acuminé, bien plus long que le précédent ; prothorax un peu plus étroit que les élytres, très rétréci en avant, impressionné obliquement en dessous du milieu, éparsément ponctué ; élytres longs, subparallèles, atténués à l'extrémité, courtement déprimés à la base. Long. près de 4 mill. Bolivie (Germain).

Globicornis latenotata n. sp. Robustus, subnitidus, niger, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris nigris, ad basin late et ad apicem mediocre testaceo maculatis.

Robuste, un peu brillant, orné d'une pubescence redressée en partie jaune, fortement et densément ponctué sur l'avant-corps, plus éparsément sur les élytres, noir avec la base des antennes et les pattes testacées, élytres noirs avec une grande macule basale et une moyenne apicale, celles-ci testacées. Long. près de 4 mill. République Argentine.

Voisin de *G. argentina* Pic, plus robuste avec la coloration testacée largement étendue sur toute la base des élytres et la ponctuation différente.

Trogoderma Gounellei n. sp. Oblongus, subnitidus, niger, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, capite et thorace fulvo aut albido pubescente, elytris albo maculatis.

Oblong, un peu brillant, noir avec les antennes et les pattes rousses, cuisses parfois obscurcies, dessous pu-

bescent de blanc, dessus, sur la tête et le prothorax pubescent de fauve et de gris, la pubescence formant sur le prothorax des mouchetures blanches sur fond fauve, élytres ornés sur la base, après le milieu et avant l'extrémité, de petites macules blanches. Tête densément ponctuée, prothorax de même, celui-ci court, subarqué en avant, cilié sur les côtés ; élytres subparallèles, pas très longs, atténués à l'extrémité, rugueusement ponctués. Long. 4,5-5 mill. Brésil : S. de Diamantina (E. Gounelle).

Cette jolie espèce peut prendre place près de *T. bicinctum* Reitt., elle en diffère, à première vue, par sa coloration et les nombreuses macules blanches des élytres.

Trogoderma seminigra n. sp. Ovatus, nitidus, niger, elytris ad basin late rufis, multi albo maculatis, antennis pedibusque testaceis.

Ovalaire, brillant, finement ponctué, orné de poils soulevés en partie foncés et de poils gris en partie couchés, noir avec les élytres largement marqués de roux près de la base et ornés de nombreuses petites macules blanches, antennes et pattes testacées, dessous pubescent de blanc. Long. 3,5 mill. Madagascar.

Cette jolie espèce, très distincte par son système de coloration et les nombreuses macules blanches des élytres, est plus petite et de forme plus courte que le précédent.

Eucnocerus Baeri n. sp. ♂ Oblongus, postice attenuatus, fere opacus, densissime punctatus, irregulariter griseo pubescens, niger, antennis tarsisque testaceis, elytris apice rufescentibus.

Oblong, atténué postérieurement, presque mat par suite de la ponctuation très dense, moins serrée et plus forte sur les élytres que sur l'avant-corps, orné d'une pubescence grise, irrégulièrement disposée sur le dessus du corps, noir avec le sommet des élytres roux, les antennes et les tarses testacés. Tête grande, antennes épais-

ses, fortement dentées presque dès la base, dernier article court ; prothorax court, très rétréci en avant, impressionné sur la base ; élytres de la largeur du prothorax, progressivement atténués en arrière, rebordés à la base ; pattes relativement longues. Long. 3,5 mill. Buenos-Ayres (Baer).

Diffère, à première vue, de *E. dispar* Sharp. par les élytres non maculés de roux et les pattes plus foncées.

Phradonoma impressiceps n. sp. Curtus et ovatus, nitidus, infra niger, supra rufescens, antennis pedibusque testaceis, thorace elytrisque albo maculatis.

Court et ovalaire, brillant, éparsément pubescent de gris, avec de petites macules blanches sur le prothorax et les élytres, dessous noir, dessus roussâtre, rembruni par places, antennes et pattes testacées. Tête densément ponctuée, impressionnée entre les yeux ; prothorax court, rétréci en avant, sillonné de chaque côté près du milieu sur la base, à ponctuation médiocre, plus espacée sur le disque ; élytres courts et larges, à épaules très marquées, courtement rétrécis au sommet, médiocrement ponctués. Long. 3 mill. Madagascar.

Voisin de *T. nobile* Reitt., forme plus courte, épaules plus marquées, tête impressionnée entre les yeux, etc.

Thanmaglossa testaceipes n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, griseo et obscuro pilosus, niger, pro parte rufescens, antennis pedibusque testaceis.

Oblong ovalaire, brillant, orné de poils dressés gris et obscurs, noir, roussâtre par places sur les élytres et les côtés du prothorax, antennes et pattes testacées. Tête médiocrement ponctuée, yeux grands, antennes à dernier article très large et aplati, presque arrondi ; prothorax court et très large, faiblement rétréci en avant, rebordé sur les côtés, éparsément ponctué ; élytres de la largeur du prothorax, courtement atténués et subarrondis au sommet, éparsément ponctués ; dessous noir de poix avec le sommet de l'abdomen roussâtre. Long. 3 mill. Nouvelle Guinée : Stephansort.

Diffère de *T. concavifrons* Reitt. par la tête non excavée et plus foncée, la ponctuation espacée des élytres, etc.

Trinodes Guernei n. sp. Nitidus, luteo hirsutus, sparse punctatus, nigro-piceus, antennis, pedibus, scutello elytrisque testaceis.

Brillant, éparsément ponctué, orné de longs poils jaunes, noir de poix, antennes, pattes, écusson et élytres testacés. Prothorax caréné et impressionné sur les côtés en arrière, échancré sur la base devant l'écusson, éparsément ponctué sur le disque ; écusson grand ; élytres plus larges que le prothorax, à épaules marquées mais arrondies, atténués postérieurement, éparsément ponctués. Long. 2,3 mill. Ceylan : Kandy (Jules de Guerne).

Cette espèce est très distincte des deux espèces décrites de Ceylan par la coloration testacée de ses élytres.

Calymmaderus latipennis n. sp. Oblongus, satis latus, opacus, niger, supra aureo et irregulariter pubescens, elytris in disco costulatis et lateraliter striatis.

Oblong, assez large, opaque, noir, orné en dessus d'une pubescence courte, dorée, irrégulièrement disposée, formant des bandes ou des mouchetures. Prothorax court, très rétréci en avant ; écusson pubescent de doré ; élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, un peu rétrécis et explanés à l'extrémité ayant de petites côtes sur le disque et des stries latérales ; pattes foncées. Long. 5 mill. Brésil : Rio Verde.

Très voisin de *C. subopacus* Pic, mais forme plus trapue, élytres nettement costulés sur le disque, etc.

Calymmaderus rufomaculatus n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, abdomine pedibusque rufescentibus, elytris in disco rufo-maculatis.

Oblong, brillant, noir de poix avec l'abdomen et les pattes rousses, élytres ornés chacun, sur le disque, d'une grande macule rousse à contours irréguliers, paraissant faite de deux macules juxtaposées et réunies bout à bout. Prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation fine et espacée ; écusson foncé ; élytres peu plus larges que le

prothorax, atténués à l'extrémité, finement ponctués, ayant deux stries raccourcies avant le milieu et près de la suture et 2 faibles stries latérales postérieures. Long. 2,5 mill. Brésil : Tijuca (Gounelle).

Cette petite espèce, bien distincte par sa coloration, peut prendre place près de *C. rufonitens* Pic.

Xyletinus Wagneri n. sp. Parum elongatus, subparallelus, subopacus, griseo aut luteo pubescens, testaceus, oculis nigris

Peu allongé, subparallèle, presque opaque avec les élytres légèrement brillants, orné d'une pubescence grise ou jaunâtre peu rapprochée et légèrement soulevée, testacé avec les yeux noirs. Tête grosse, densément ponctuée ; antennes longues et assez robustes, assez longuement dentées à partir du 4e article ; prothorax densément ponctué, court et large, subarqué sur les côtés, nettement élevé sur le milieu de sa base ; élytres de la largeur du prothorax, parallèles, courtement rétrécis au sommet, fortement strié-ponctués. Long. 3 mill. République Argentine : Rio Salado (Wagner).

Très voisin de *X. distinctevestitus* Pic, coloration différente et prothorax nettement élevé sur le milieu de sa base.

Xyletinus griseopubens n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-piceus, griseo-holosericeo pubescens, elytris striatis et lineatis.

Allongé, brillant, noir de poix, revêtu d'une pubescence grise, fine et soyeuse, celle-ci dessinant sur les élytres et entre les stries, des lignes grises plus ou moins nettes. Tête plus étroite que le prothorax, celui-ci court et très large, impressionné de chaque côté sur la base et subsillonné au milieu ; élytres de la largeur du prothorax, longs, rétrécis à l'extrémité, finement mais nettement strié-ponctués. Long. 5 mill. Brésil : Mineiro.

Diffère de *X. discoidalis* Pic, par la coloration plus foncée, les stries ponctuées plus marquées et les lignes pubescentes des élytres.

Lytta adonis n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite postice pro majore parte, thorace lateraliter elytrisque ad basin et lateraliter ad medium testaceis.

Allongé, un peu brillant, orné en dessus de poils dressés, rapprochés, courts, clairs ou foncés, noir avec la majeure partie de la tête (celle-ci noire devant les yeux), les côtés du prothorax, la base et les côtés des élytres au milieu, testacés. Tête subtriangulaire, impressionnée entre les yeux ; antennes courtes, assez grêles ; prothorax plus long que large, subanguleusement dilaté sur le milieu des côtés, très rétréci en avant, sillonné sur le disque ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, faiblement élargis vers l'extrémité, finement et ruguleusement ponctués ; dessous du corps foncé, abdomen en partie revêtu de longs poils argentés. Long. 28 mill. Brésil : Sao Paulo.

Cette grande et belle espèce peut se placer près de *L. fissiceps* Haag, dont elle diffère, à première vue, par la structure de la tête et la coloration différente.

Lytta taliana n. sp. Elongatus, supra fere glaber, niger, capite postice thoraceque testaceis.

Allongé, presque glabre en dessus, brillant sur l'avant-corps, presque mat sur les élytres, noir, avec la moitié postérieure de la tête et le prothorax testacés. Tête grande, biimpressionnée entre les yeux, faiblement sillonnée sur le vertex, de la largeur du prothorax ; antennes courtes, à articles 5 à 10 subglobuleux, dernier plus étroit, acuminé ; prothorax particulier, rétréci-étranglé en avant, déprimé sur les côtés avec les bords un peu élevés, échancré et rebordé à la base, sillonné au milieu ; élytres plus larges que le prothorax, parallèles, finement ruguleux avec des traces de côtes ; dessous brillant, pubescent de gris. Long. 22 mill. Chine méridionale : Tali.

Diffère de *L. spinicornis* Frm. (ex-description) par la coloration bicolore de la tête et la structure différente du prothorax.

Tetraonyx metallicus n. sp. Parum elongatus,

nitidus, metallicus, cæruleo-viridescens, elytris in disco cupreo-violaceis, coxis posticis rufo notatis.

Peu allongé, brillant, métallique, bleu-verdâtre avec le milieu des élytres d'un cuivreux violacé. Prothorax transversal, échancré sur les côtés, impressionné sur le milieu de la base ; élytres larges et assez longs, subparallèles ; dessous du corps métallique avec la lame des hanches postérieures en partie rousse. Long. 2, 3 mill. Colombie.

Voisin de *T. pectoralis* Haag, dessus brillant, mesosternum foncé, etc.

Tetraonyx (1) **panamensis** n. sp. Crassus, opacus, nigro-cyanescens, elytris ad basin et ad medium rufo trimaculatis (1, 2) ; thorace transverso, lateraliter exciso, medio impresso.

Epais, opaque, noir-bleuâtre, élytres ornés chacun de trois macules arrondies rousses, une basale médiane, deux transversales vers le milieu, membres foncés. Prothorax transversal, échancré sur les côtés, impressionné sur le milieu ; élytres larges et assez courts. Long. 17 mill. Panama.

Voisin de *T. 8-maculatus* Latr., mais élytres ornés d'une seule macule basale et celle-ci différente, arrondie.

Tetraonyx multinotatus n. sp. Crassus, opacus, niger, capite thoraceque lateraliter, femoribus apice anoque rufo-testaceis, elytris nigris, ad basin rufo-testaceo lineatis et ad medium rufo-testaceo fasciatis ; thorace breve et transverso, lateraliter exciso, medio canaliculato.

Epais, opaque, noir avec les côtés de la tête et ceux du

(1) Dans Biologia Centr. Am. IV, pt. 2, tab. 18, 2 formes du Guatemala, attribuées à *T. sexguttatus* Ol., mais qui pourraient bien être des espèces propres (ex figures) méritent d'être nommées, ce sont :

Rufomarginatus (fig. 4). Niger, elytris strangulato rufo cinctis et transverse bifasciatis.

Championi (fig. 6). Niger, elytris rufis, circa scutellum late nigro notatis et postice breve nigro trimaculatis (2, 1), macula apicalis ad suturam sita.

prothorax, la base des cuisses et l'anus d'un roux testacé, élytres avec une étroite et courte bande subarquée basale d'un roux testacé, et une fascie postmédiane ondulée de même coloration. Prothorax court et très transversal, sillonné sur le disque ; élytres courts et larges. Long. 17 mill. ? Brésil.

Voisin de *T. zonatus* Haag, mais élytres ornés d'une ligne basale testacée, hanches foncées, etc.

Tetraonyx Baeri n. sp. Crassus, subopacus, infra testaceus, scutello testaceo, capite thoraceque testaceis, nigro maculatis, elytris nigro-piceis, testaceo lineatis ; antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus testaceis, femoribus nigro annulatis, tibiis apice tarsisque nigris ; thorace breve et transverso, lateraliter exciso.

Epais, subopaque, dessous testacé, parfois maculé de foncé, dessus en partie testacé, en partie foncé ; tête et prothorax testacés, la première maculée de foncé sur le vertex, le second bimaculé de foncé sur le disque, écusson testacé ; élytres noir de poix, parfois un peu rembrunis, ornés sur chacun de 2 bandes discales étroites testacées, jointes postérieurement et en outre étroitement bordés de même coloration ; antennes noires, testacées à la base, pattes bicolores. Long. 10-12 mill. République Argentine : Tapia (Baer).

Cette jolie espèce peut prendre place près de la précédente, elle en est très distincte par ses bandes longitudinales testacées.

Tetraonyx atricolor n. sp. Crassus, opacus, supra ater, infra atro-cyanescens ; thorace transverso, lateraliter fere recto et incarinato.

Épais, opaque, noir en dessus, noir bleuâtre en dessous et sur les pattes. Prothorax transversal, presque droit sur les côtés et non caréné, impressionné transversalement devant la base ; élytres courts et larges. Long. 9 mill. Pérou.

Peut se placer près de *T. Clarki* Pascoe, en diffère

par les élytres noirs, le 1er article des tarses postérieurs foncé et les élytres non élargis postérieurement.

Tetraonyx superbus n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, infra niger, supra testaceus, nigro maculatus, antennis scutelloque nigris, pedibus nigris, femoribus ad basin tibiis ad medium testaceis ; thorace subtransverso, lateraliter fere recto ; elytris satis elongatis, costatis.

Assez allongé, un peu élargi postérieurement, un peu brillant, noir en dessous, aux antennes et sur l'écusson, testacé en dessus et maculé de noir de la façon suivante : tête entre les yeux et sur le milieu du vertex, prothorax étroitement au milieu, élytres près de la base, cette macule à contours irréguliers n'atteignant pas la suture, et en outre largement noirs à l'extrémité, pattes bicolores. Long. 18 mill. Brésil : Mineiro.

Cette jolie espèce, très distincte par sa forme relativement allongée jointe à ses élytres costulés et son système de coloration, peut prendre place près de *T. maculatus* Cast.

Tetraonyx incarinatus n. sp. Parum elongatus, satis nitidus, niger, thorace testaceo, in disco postice nigro maculato, illo breve, transverso, lateraliter fere recto et incarinato.

Un peu allongé, assez brillant, entièrement noir membres compris à l'exception du prothorax qui est testacé et maculé de foncé sur le disque postérieurement. Prothorax court et très transversal, presque droit et non caréné sur les côtés, biimpressionné sur le disque ; élytres pas très larges et assez longs. Long. 8 mill. Brésil : S. Catharina.

Voisin de *T. maculicollis* Haag, dont il diffère par la structure du prothorax.

Tetraonyx griseipennis n. sp. Parum elongatus, satis nitidus, niger, thorace testaceo, in disco postice obscure maculato, elytris in disco grisescentibus ; tho-

race breve, transverso, lateraliter fere recto et incarinato.

Peu allongé, assez brillant, noir avec les élytres grisâtres sur leur disque, le prothorax testacé, maculé de foncé sur le disque en arrière. Prothorax court et très transversal, presque droit et non caréné sur les côtés, impressionné au milieu devant la base ; élytres pas très larges et assez longs, nettement atténués et assez déhiscents au sommet. Long. 8 mill. Brésil : Rio Verde.

Voisin du précédent, prothorax autrement impressionné, élytres grisâtres et plus atténués à l'extrémité.

Tetraonyx innotaticeps n. sp. Satis latus, nitidus, testaceus, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris ; thorace transverso, lateraliter carinato.

Assez large, brillant, éparsément pubescent, testacé avec les antennes, les genoux, tibias et tarses noirs. Prothorax transversal, carré sur les côtés, relevé sur la base, éparsément ponctué ; élytres assez larges, élargis postérieurement et rétrécis ensuite au sommet. Long. 8 mill. Brésil.

Voisin de *T. nigricornis* Haag, en diffère par la tête immaculée, les tibias entièrement foncés, etc.

Tetraonyx nigerrimus n. sp. Elongatus, subnitidus, niger, griseo sat sparse pubescens ; thorace transverso, lateraliter carinato.

Allongé, un peu brillant, entièrement noir, orné d'une pubescence grise, peu serrée, fine et couchée. Prothorax transversal, caréné sur les côtés, triimpressionné sur le disque ; élytres nettement plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, courtement atténués au sommet. Long. 11 mill. Brésil : S. Catharina (Funke).

Voisin du précédent par son prothorax caréné, mais forme plus allongée et coloration générale noire.

Spastica lineata n. sp. Satis elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite postice, thorace (postice nigro maculato), femoribus tibiisque pro parte rufo-testaceis, elytris testaceis, apice in disco nigro lineatis.

Assez allongé, brillant, orné d'une fine pubescence grise couchée, presque entièrement noir en dessous, noir également sur une partie de la tête, des cuisses et des tibias, ainsi que sur les antennes et l'écusson, prothorax testacé rougeâtre, orné d'une macule discale postérieure noire, élytres testacés avec une bande longitudinale discale noire, commençant en dessous du milieu et atteignant le sommet. Long. 13 mill. Brésil.

Voisin de *S. maculicollis* Klug, en diffère par la tête non carénée, le prothorax indistinctement impressionné et la coloration.

Spastica brasiliensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, griseo aut fusco pubescens, niger, thorace, femoribus et tibiis posticis ad basin testaceis, elytris antice lateraliter albo marginatis.

Assez allongé, brillant, orné d'une pubescence courte, en partie soulevée, grise ou foncée, noir avec le prothorax, les cuisses et environ la moitié basale des tibias postérieurs testacés, élytres bordés étroitement de blanc de la base un peu au-delà du milieu. Long. 12 mill. Brésil : Espirito Santo.

Voisin de *S. marginalis* Haag et distinct, à première vue, par la coloration en partie testacée des pattes.

Spastica discoidalis n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite thoraceque rubro-testaceis, elytris nigris, in disco ad medium lineato testaceis.

Peu allongé, brillant, orné d'une pubescence grise couchée, noir, avec la tête et le prothorax d'un testacé rougeâtre, élytres ornés, sur leur disque au milieu, d'une bande longitudinale testacée, celle-ci assez large et plus rapprochée de la base que du sommet. Long. 8 mill. Brésil : Bahia.

Voisin de *S. bicolor* Pic (1), forme élytrale un peu plus allongée et coloration différente.

(1) Décrit par erreur, en 1896, comme *Copobaeneus* Frm. et Germ.

Spastica pulchra n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, oculis, antennis, tibiis tarsisque nigris, elytris nigris, in disco late testaceis.

Peu allongé, brillant, orné d'une pubescence grise couchée, avec quelques poils obscurs soulevés, testacé avec les yeux, les antennes, les tibias et les tarses noirs, élytres noirs à la base, au sommet et étroitement sur les côtés, avec tout le milieu largement testacé. Long. 6 mill. Brésil : S. Catharina.

Distinct du précédent par la coloration testacée plus étendue sur les élytres, le dessous du corps et les cuisses testacés.

Spastica Wagneri n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceo-rufescens, capite, antennis, abdomine tibiisque nigricantibus.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise, assez longue et en partie redressée, testacé-roussâtre avec la tête, les antennes, les tibias et l'abdomen noirs. Tête longue, densément ponctuée ; prothorax étroit, rétréci en avant, à ponctuation forte et peu rapprochée ; élytres fortement et densément ponctués, surtout antérieurement. Long. 7 mill. Rio Salado (Wagner).

Le prothorax de cette espèce est moins large que celui des espèces précédentes, la forme est un peu plus allongée. Peut se placer près de *S. sphaerodera* Burm.

Spastica bilineata n. sp. Parum elongatus, subnitidus, griseo pubescens, niger, pedibus pro parte, capite (inter oculos nigro notato) thoraceque testaceis, elytris nigris, lateraliter anguste testaceo limbatis et in disco anguste testaceo lineatis.

Peu allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence grise, courte et couchée, noir avec la base et le sommet des cuisses, la base des tibias, la tête (celle-ci avec une macule frontale noire) et le prothorax testacés, ce dernier biimpressionné ; élytres noirs, ornés chacun d'une étroite bordure latérale testacée et d'une étroite bande discale de même coloration, celle-ci partant des épaules

et dirigée obliquement vers la suture en arrière. Long. 11 mill. Brésil : Mineiro.

Par son prothorax distinctement impressionné, peut prendre place près de *S. variabilis* Haag, dont il est très distinct par les bandes étroites testacées des élytres.

Zonitis oceanicus n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, testaceus, oculis, antennis pro parte tarsisque nigris.

Allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence grise couchée, testacé avec les yeux, les tarses et les antennes en majeure partie foncés, articles 2 et suivants testacés à la base, 1er testacé. Tête longue, à ponctuation forte et écartée sur le vertex ; antennes un peu moins longues que le corps ; prothorax allongé, très rétréci en avant, fortement et densément ponctué ; élytres nettement plus larges que le prothorax, subparallèles, densément et ruguleusement ponctués. Long. 10 mill. Sumbawa.

Voisin de *Z. celebensis* Pic, antennes moins longues, prothorax plus densément ponctué, élytres n'ayant pas de macule apicale foncée.

Zonitis elongatipennis n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, testaceus, oculis articulis 2 et sequentibus antennarum, tibiis tarsisque nigris.

Allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence grise couchée, testacé avec les yeux, les antennes, moins le premier article qui est testacé, les tibias et tarses noirs. Tête longue, finement ponctuée ; antennes un peu moins longues que le corps, à 2e article bien plus court que le 3e ; prothorax allongé, très rétréci en avant, à ponctuation fine et écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, très longs, subparallèles, densément ponctués. Long. 15 mill. Chine : Kiangsi.

Très voisin de *Z. japonicus* Pic, 2e article des antennes plus court comparé au 3e, tête plus étroite, prothorax plus finement ponctué, etc.

Azarelius indicus n. sp. Angustatus, nitidus,

rufus, oculis griseis ; thorace elongato, multiplicato ; elytris 6 costatis et late punctatis.

Etroit, brillant, roux, yeux gris. Antennes à derniers articles plus courts ; prothorax allongé, orné sur le disque de plusieurs plis brillants, 4 plus courts au milieu dont deux antérieurs plus rapprochés et deux postérieurs écartés, un autre antérieur et externe subsinué ; élytres un peu plus larges que le prothorax ayant chacun, en outre de la suturale, 6 côtes et marqués d'une ponctuation large et profonde, s'effaçant à l'extrémité. Long. 4 mill. environ. Indes : Pégu.

A placer près de *A. sculpticollis* Frm., de Sumatra.

Gonocnemis minutus n. sp. Robustus, parum nitidus, luteo pubescens, rufescens, oculis nigris.

Robuste, un peu brillant, orné d'une pubescence jaune, courte et espacée, roussâtre avec les yeux noirs. Oreillettes peu saillantes ; antennes atteignant le milieu des élytres ; prothorax subtransversal, un peu rétréci en avant, triimpressionné postérieurement, densément ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, atténués à l'extrémité, fortement strié-ponctués avec les intervalles carénés. Long. 4,5 mill. Laos.

Plus trapu que *G. 4-collis* Frm., avec les élytres plus atténués postérieurement, etc.

Gonocnemis sumatrensis n. sp. Parum elongatus et parum nitidus, luteo pubescens, rufus, oculis griseis.

Peu allongé et peu brillant, orné d'une pubescence jaune, courte et espacée, roux avec les yeux gris. Long. 4,5 mill. Sumatra.

Très voisin du précédent, mais prothorax moins large et peu impressionné, plus sinué sur les côtés, élytres plus allongés, à ponctuation moins marquée.

Gonocnemis sibutensis n. sp. Satis angustatus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris subaeneis, tarsis rufescentibus.

Assez allongé, brillant, peu distinctement pubescent de gris, noir, avec les élytres un peu bronzés, tarses roussâtres. Oreillettes assez saillantes ; antennes dépassant de3 articles le bord postérieur du prothorax ; prothorax subcarré, faiblement sinué sur les côtés, impressionné au milieu de la base, à ponctuation irrégulière et dense ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, parallèles, fortement ponctués avec les intervalles carénés. Long. 10 mill. Haut-Chari : Fort Sibut.

Peut se placer près de *S. 4-collis* Frm. = *Fairmairei* Geb., du Sénégal.

Gonocnemis subaeneus n. sp. Modice elongatus, nitidus, luteo pubescens, niger, thorace elytrisque subaeneis.

Modérément allongé, brillant, orné d'une pubescence jaune, courte et espacée, noir, un peu bronzé sur le prothorax et les élytres. Oreillettes peu saillantes ; antennes atteignant le tiers des élytres ; prothorax presque carré, sinué sur les côtés, tri-impressionné à la base, et sillonné au milieu, densément ponctué ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, fortement ponctués avec les intervalles carénés. Long. 10 mill. Congo Français.

Moins étroit que le précédent, avec le prothorax nettement sillonné au milieu.

Gonocnemis simplicicollis n. sp. Elongatus, subopacus, griseo pubescens, supra nigro-piceus, infra pedibusque rufescentibus.

Allongé, presque opaque en dessus, orné d'une pubescence grise, courte et espacée, noir de poix en dessus, roussâtre en dessous et sur les pattes. Oreillettes assez saillantes ; antennes dépassant le prothorax de deux articles ; prothorax peu plus long que large, sinué sur les côtés, presque égal en dessus avec une simple dépression sur la base, très densément ponctué ; élytres nettement plus larges que le prothorax, longs, parallèles,

à ponctuation pas très forte, intervalles carénés. Long. 9 mill. Afrique occidentale : Salamat.

Moins étroit et ponctuation plus fine que chez *G. sinuaticollis* Kolbe près duquel on peut le placer.

Gonocnemis abyssinicus n. sp. Elongatus, subnitidus, luteo pubescens, niger.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence jaune courte et espacée, noir. Oreillettes assez marquées ; antennes dépassant le prothorax de 3 articles ; prothorax un peu plus long que large, sinué sur les côtés, presque égal en dessus, densément ponctué avec une trace de carène au milieu du disque ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, assez fortement ponctués, moins à l'extrémité, avec les intervalles carénés. Long. 12 mill. Abyssinie : Harras.

Voisin de *G. aethiopicus* Frm., moins pubescent, ponctuation différente, etc. ; diffère, d'autre part, de *G. Raffrayi* Frm. par le prothorax plus étroit et la coloration plus foncée.

Lyprops sumatrensis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, sat fortiter et sparse punctatus.

Oblong, brillant, noir, membres compris, orné d'une pubescence grise espacée et marqué d'une ponctuation assez forte et un peu écartée. Tête impressionnée devant les yeux ; antennes courtes et robustes, à articles 6 et suivants très larges ; prothorax large, arqué sur les côtés, à angles postérieurs presque droits ; élytres bien plus larges que le prothorax, faiblement élargis vers l'extrémité et rétrécis ensuite, à ponctuation irrégulièrement disposée. Long. 9 mill. Sumatra.

A placer près de *L. atronitens* Frm., en diffère par les pattes foncées et la ponctuation plus forte.

Lyprops violaceipennis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris purpureo-violaceis et subcostulatis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise, espacée, peu visible, noir avec les élytres d'un pourpré violacé.

Tête à ponctuation irrégulière, assez forte ; antennes courtes, à articles 6 et suivants presqne carrés ; prothorax assez court, subarqué sur les côtés, à angles postérieurs petits, à ponctuation assez forte et écartée ; élytres bien plus larges que le prothorax, faiblement élargis vers l'extrémité et rétrécis ensuite, à ponctuation forte, en partie rapprochée avec des traces de costules longitudinales. Long. 12 mill. Java : Sukabumi.

Cette jolie espèce, voisine de la précédente, en est très distincte par la coloration de ses élytres qui, en outre, présentent des traces de petites côtes.

Lyprops costulatus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris viridi-cupreis et costulatis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise espacée à peine visible, noir avec les élytres d'un vert cuivreux. Tête à ponctuation irrégulière ; antennes assez courtes, à articles 6 et suivants progressivement élargis ; prothorax large, subarqué sur les côtés, à angles postérieurs petits, à ponctuation fine et espacée ; élytres bien plus larges que le prothorax, faiblement élargis vers l'extrémité et rétrécis ensuite, à ponctuation irrégulière, assez fine, avec de petites côtes longitudinales. Long. 12-13 mill. Cochinchine : Hué.

Très distinct du précédent par la coloration, les élytres à côtes plus distinctes et à ponctuation moins forte.

Lyprops rufescens n. sp. Parum elongatus, nitidus, luteo pubescens, rufescens, antennis apice nigris.

Peu allongé, brillant, orné d'une pubescence jaune espacée, courte mais bien visible, à ponctuation forte et plus ou moins rapprochée, roussâtre, un peu rembruni par places, articles 6 et suivants des antennes noirs. Long. 7 mill. Dahomey.

Voisin de *L. pilosus* Mull. et distinct, à première vue, par la coloration bicolore des antennes.

Lyprops abyssinicus n. sp. Oblongus, nitidus, luteo sat longe pubescens, rufescens, thorace brunnes-

cente, capite antennisque, articulis primis exceptis, nigris.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence jaune assez longue et en partie redressée, roux avec le prothorax rembruni, la tête et les antennes noires, ces derniers organes ayant seulement leurs premiers articles roux. Long. 7 mill. Abyssinie.

Très voisin du précédent, élytres plus larges, avant-corps plus foncé et plus fortement ponctué, pubescence plus longue, etc.

Baolacus nov. genus. Capite in fronte excavato ; antennis crassis, apice parum attenuatis, articulis 2 primis brevibus ; thorace breve, lateraliter postice carinato, ad basin transverse impresso ; elytris dehiscentibus, satis elongatis ; abdomine prominulo ; pedibus validis, tarsis elongatis.

Ce nouveau genre, rentrant dans les *Drilidæ*, peut se placer près de *Falsophænopterus* Pic, il est très distinct par la structure de ses antennes et de son prothorax ainsi que par ses élytres débordés par les ailes et par l'abdomen.

Baolacus Lajoyei n. sp. Parum elongatus, rufo-testaceus, capite postice, scutello elytrisque nigris, abdomine brunnescente.

Peu allongé, un peu brillant, sauf sur les élytres qui sont très densément ponctués et opaques, pubescent de gris, roux testacé, l'abdomen étant un peu rembruni avec la partie postérieure de la tête, l'écusson et les élytres noirs. Tête fortement ponctuée ; prothorax à ponctuation irrégulière, forte et dense, sillonné au milieu ; élytres un peu plus larges que le prothorax, déhiscents dès la base, progressivement atténués postérieurement et un peu relevés au sommet ; ailes enfumées. Long. 6 mill. Tonkin : Bao-Lac. — Reçu autrefois de Lajoye à la mémoire duquel cette nouveauté est dédiée

Phrisothrix atriceps n. sp. Pallido-testaceus, ca-

pite nigro, antice rufescente, dense punctato ; thorace opaco ; elytris nitidis, valde dehiscentibus.

Testacé pâle, membres compris, avec la tête noire, roussâtre antérieurement, celle-ci densément ponctuée. Antennes courtes, à rameaux peu épais ; prothorax un peu plus large que long, presque droit sur les côtés, opaque ; élytres peu plus larges que le prothorax, très déhiscents, nettement relevés au sommet et médiocrement ponctués ; ailes claires. Long. 6,5-8 mill. République Argentine.

Voisin de *P. pallens* Berg. mais ponctuation de la tête dense, prothorax opaque, etc.

Phrisothrix (1) **nigricollis** n. sp. Pallide testaceus, capite thoraceque late nigris et dense punctatis, thorace opaco ; scutello rufescente ; elytris subnitidis, valde dehiscentibus.

Testacé pâle avec la majeure partie de la tête et du prothorax (la 1re rousse en avant, le 2e étroitement bordé de roux) noirs, ces organes densément ponctués et opaques. Antennes courtes, à rameaux peu épais ; prothorax presque carré ; écusson roux ; élytres peu plus larges que le prothorax, très déhiscents, peu relevés au sommet, peu brillants ; ailes claires. Long. 8 mill. Rép. Argentine : Grand Chaco.

Diffère du précédent, en outre de la coloration du prothorax, par les élytres moins brillants, à peine relevés au sommet et plus nettement ponctués.

Phrisothrix brasiliensis n. sp. Pallide testaceus, capite brunnescente, oculis nigris, nitidissimus, antice sparse punctatus.

Testacé pâle, avec la tête rembrunie et les yeux noirs,

(1) Dans la collection Olivier, au Museum de Paris, se trouvent deux petites espèces inédites, voisines de celle-ci, et dont voici les diagnoses :

P. patruelis E. Ol. Testaceus, capite nigro, thorace in disco nigro notato, antennis pro parte piceis.

P. argentinus E. Ol. Testaceus, capite nigro, thorace in disco breve nigro notato, antennis testaceis.

très brillant, finement et éparsément ponctué sur l'avant-corps. Antennes courtes, tige roussâtre, rameaux testacés et minces ; prothorax assez large, un peu diminué en avant avec les angles très arrondis ; élytres très déhiscents, non relevés au sommet ; ailes claires. Long. 10 mill. Brésil : Rio Grande do Sul.

Diffère nettement de *P. atriceps* Pic par l'aspect plus brillant et la ponctuation fine et écartée de l'avant-corps.

Phrisothrix obscuripes n. sp. Nitidus, supra antennisque nigris, infra thoraceque testaceis, pedibus piscescentibus.

Brillant, prothorax et dessous testacés, pattes obscurcies, au moins en partie, dessus avec les antennes noires. Tête à ponctuation forte et écartée ; antennes courtes, à rameaux minces ; prothorax pas très court, très rétréci en avant, finement et éparsément ponctué ; élytres déhiscents, longs, très rétrécis et un peu moins foncés à l'extrémité ; ailes un peu enfumées. Long. 13 mill. Rép. Argentine : Gallarcita.

Voisin de *P. Heydeni* E. Ol., en diffère à première vue par l'écusson foncé et le prothorax ponctué.

Phrisothrix obscurus n. sp. Pro parte obscurus, capite thoraceque nigris, antennis elytrisque nigro-piceis, scutello, infra corpore pedibusque testaceis.

En partie obscur, avant-corps noir et brillant, finement et éparsément ponctué, antennes et élytres noir de poix, ces derniers brillants à la base, ruguleux et subopaques au sommet, écusson, dessous et pattes testacées, ailes enfumées. Long. 13 mill. Bolivie : Chaco.

Très distinct du précédent par les élytres moins longs, à double sculpture, le prothorax foncé, l'écusson plus clair, etc.

Phrisothrix nigrofasciatus n. sp. Pro parte obscurus, pro parte testaceus aut rufescens, elytris fere opacis, ante apicem nigro fasciatis. Long. 10 mill. environ. Bolivie.

Cette espèce est très distincte entre toutes par la coloration tricolore de ses élytres : ces organes sont roux à la base, testacés postérieurement avec, au milieu de la coloration plus claire, une large bande noire transversale.

Ascaphidium n. gen. Articulis 5, 6 antennarum validis et brevibus ; thorace ad basin irregulariter et pro parte bilineato punctato ; elytris brevibus, convexis, ad suturam mediocre lineato-punctatis.

Ce nouveau genre, proche voisin du genre *Scaphidium* Ol., se distingue, à première vue, par la structure moins grêle de la tige des antennes, surtout par les articles 5 et 6 courts et élargis, ainsi que par la strie suturale très fine et médiocrement ponctuée. L'écusson est un peu enfoncé entre les parties voisines des élytres qui sont bombées.

Ascaphidium Sikorai n. sp. Subovatus, nitidus, rufescens, thorace elytrisque late in disco, infra corpore pro parte et articulis 5 ultimis antennarum nigris, femoribus ad apicem albo annulatis ; elytris irregulariter sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Madagascar : Annanarivo (Sikora).

Scaphosoma Dohertyi n. sp. Ovatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque pallidioribus, oculis nigris, elytris post medium piceo notatis.

Ovalaire, brillant, roux-testacé, les membres étant plus clairs, avec les yeux noirs, élytres ornés, en dessous du milieu, d'une macule subtransversale foncée. Tête très finement ponctuée ; prothorax pas très court, rétréci en avant, à ponctuation médiocre et espacée ; élytres de la largeur du prothorax, courts, subarqués sur les côtés, tronqués au sommet, à ponctuation forte, disposée irrégulièrement et éparsément, à strie suturale fine, recourbée à la base. Long. 2 mill. environ. Malacca : Perak (Doherty).

Peut se placer près de *S. castaneipenne* Reitt., dont il diffère par la ponctuation écartée et les élytres maculés de foncé.

TABLE

POUR LE QUINZIÈME FASCICULE

	Pages.
Introduction	1
Nouvelles espèces de diverses familles.	2